Boletim Epidemiológico da Dengue

Dados Referentes às Semanas Epidemiológicas: 01 a 14 - Períodos de 03/01/2016 a 09/04/2016

Ano: 09 **Número: 14** **Data de Produção: 12/04/2016**

Esse boletim está na web: www.natal.rn.gov.br/sms

A dengue em Natal

Os primeiros casos de dengue em natal, foram notificados no ano de 1996. A doença apresentou característica epidêmica em anos alternados. A partir de 2004, observou-se uma curva de crescimento no número de casos que culminou com a epidemia de 2008, desde então a dengue tornou-se um problema de saúde pública no Município de Natal.

Vigilância Epidemiológica da Dengue no Município de Natal

A vigilância epidemiológica da dengue é realizada através da vigilância da ocorrência de casos e da vigilância entomológica.

Baseada nessas estratégias, as principais funções da vigilância epidemiológica da dengue são:

- Evitar à ocorrência das infecções pelo vírus da dengue em áreas livres da circulação.
- Detectar precocemente as epidemias.
- Controlar as epidemias em curso.
- Reduzir o risco de transmissão da dengue nas áreas endêmicas.
- Reduzir a letalidade dos casos graves, mediante diagnóstico precoce e tratamento oportuno e adequado.

A dengue é uma infecção viral que se tornou um grave problema de saúde pública no Brasil, assim como em outras regiões tropicais do mundo. É de transmissão essencialmente urbana, ambiente no qual encontram-se todos os fatores fundamentais para sua ocorrência: o homem, o vírus, o vetor e principalmente as condições políticas, econômicas e culturais que formam à estrutura que permite o estabelecimento da cadeia de transmissão.

No Município de Natal, o distrito oeste apresenta a maior incidência de casos de dengue **(figura 01)**. Considerando a distribuição espacial, oito bairros estão com alta incidência de casos de dengue. Cinco estão localizados no distrito sanitário leste e três no oeste (**figura 02)**.




Figura 01: *Distribuição das incidências por distrito de residência, na semana epidemiológica de 01 a 14.*



Aedes aegypti

O mosquito transmissor da dengue e da Febre Chikungunya, prolifera-se nas proximidades onde se acumula água (vasos de planta, pneus, cisternas, etc.)




Figura 02: *Distribuição espacial das incidências dos casos notificados de dengue, nas semanas epidemiológicas 01 a 14.*





Figura 03: *Distribuição espacial das incidências dos casos notificados de dengue nas semanas epidemiológica 12 a 14.*





Considerando as últimas três semanas epidemiológicas, que correspondem às semanas 12 a 14. Observa-se, que oito bairros apresentam alta incidência de casos de dengue. Seis estão localizados no distrito sanitário leste, um no norte I e um no norte II (**figura 03)**.

O distrito norte II apresenta a maior incidência de casos de dengue nas últimas três semanas epidemiológicas **(figura 04)**. Quanto à distribuição das incidências por sexo, registra-se maior incidência na população feminina **(figura 05)**.




Figura 04: *Distribuição das incidências por distrito de residência nas semanas epidemiológica de 12 a 14.*




Figura 05: *Distribuição das incidências por sexo semana epidemiológica 01 a 14.*

Enquanto que por faixa etária, o grupo abaixo de ano são os mais afetados até a 14ª semana epidemiológica **(figura 06).**




Figura 06: *Distribuição das incidências por faixa etária na semana epidemiológica 01 a 14.*

De acordo com a portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, a dengue é uma doença de notificação compulsória e todo caso suspeito e/ou confirmado, deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica.

Em casos de suspeita de Dengue grave ou óbitos suspeito ou confirmado por dengue ligue para o CIEVS/ Natal. Disque notifica: 0800-285-9435 ou 3232 9435

Baseada na série histórica de casos de dengue em Natal, a construção do diagrama de controle ou curva epidêmica é uma ferramenta de grande relevância para vigilância epidemiológica pois, indica o comportamento da doença no município, por semana epidemiológica. Quando a linha vermelha ultrapassa a linha preta e mantendo-se acima por três semanas consecutivas, indica o início de uma epidemia de dengue. Analisando o comportamento da incidência atual, observa-se na cidade um comportamento epidêmico desde a 3ª semana. Apesar de apresentar perfil epidêmico a curva demonstra queda a partir da semana 9, estando abaixo do limite epidêmico há três semanas consecutivas **(figura 07).**




Figura 07: *Curva para acompanhamento da situação de epidemias de dengue no município de Natal/RN até a 14ª semana epidemiológica.*

Tabela 01: Resumo dos casos notificados de dengue no Município de Natal, distribuídos por bairro de residência até a 14ª semana epidemiológica.

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES E INCIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE NATAL												
DISTRITOS SANITÁRIO	BAIRROS	DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE DENGUE		CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DE DENGUE								
				DENGUE COM SINAIS DE ALARME		DENGUE GRAVE		ÓBITO POR DENGUE				TAXA DE LETALIDADE
		NOTIFICADOS	INCIDÊNCIA POR 100.000 HABITANTES	NOTIFICADOS	INCIDÊNCIA POR 100.000 HABITANTES	NOTIFICADOS	INCIDÊNCIA POR 100.000 HABITANTES	NOTIFICADOS	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	EM INVESTIGAÇÃO	
LESTE	Alecrim	438	1.485,10	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Areia Preta	24	564,44	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Barro Vermelho	23	213,60	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Cidade Alta	143	1.903,11	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Lagoa Seca	37	628,72	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Mãe Luiza	257	1.659,46	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Petrópolis	42	720,91	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Praia do Meio	55	1.080,13	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ribeira	10	429,18	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Rocas	132	1.211,68	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	Santos Reis	37	645,39	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Tirol	55	322,86	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	TOTAL	**1.253**	**1.041,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**0**	**0**	**2**	**#DIV/0!**
NORTE I	Lagoa Azul	276	421,84	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	Pajuçara	219	344,25	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	Redinha	157	861,03	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL	**652**	**442,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2**	**0**	**0**	**2**	**#DIV/0!**
NORTE II	Igapó	302	993,36	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	N. S. Apresentação	861	984,54	0	0,00	0	0,00	4	0	0	4	0,00
	Potengi	454	748,42	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	Salinas	11	852,05	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL	**1.628**	**905,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6**	**0**	**0**	**6**	**#DIV/0!**
OESTE	Bom Pastor	245	1.282,39	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	Cidade da Esperança	78	389,22	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Cidade Nova	144	764,21	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Dix Sept Rosado	162	990,70	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Felipe Camarão	650	1.193,93	0	0,00	0	0,00	3	0	0	3	0,00
	Guarapes	67	612,26	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Nordeste	122	1.009,85	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	N. S. Nazaré	114	673,72	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Quintas	494	1.756,38	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	TOTAL	**2.076**	**1.054,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5**	**0**	**0**	**5**	**#DIV/0!**
SUL	Candelária	59	246,83	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Capim Macio	35	145,77	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Lagoa Nova	156	394,16	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Neópolis	103	437,24	0	0,00	1	4,25	1	0	0	1	0,00
	Nova Descoberta	54	415,58	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	Pitimbu	169	661,76	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Planalto	334	976,15	0	0,00	0	0,00	1	0	1	0	0,00
	Ponta Negra	100	386,38	0	0,00	0	0,00	1	0	0	1	0,00
	TOTAL	**1.010**	**481,69**	**0**	**0,00**	**1**	**0,48**	**4**	**0**	**1**	**3**	**0,00**
	TOTAL DE NATAL	**6.619**	**775,13**	**0**	**0,00**	**1**	**0,12**	**19**	**0**	**1**	**18**	**0,00**

Chikungunya

Febre Chikungunya é uma doença parecida com a dengue, causada pelo vírus CHIKV, da família Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito *Aedes aegypti* infectado e, menos comumente, pelo mosquito *Aedes albopictus*. Seus sintomas são semelhantes aos da dengue: febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande diferença da febre Chikungunya está no seu acometimento das articulações: o vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local.

Atualmente, foram confirmados 9 casos de Chikungunya no Município de Natal. Sendo 3 casos no bairro de Lagoa Azul, 4 casos em Nossa Senhora da Apresentação e 2 no bairro de Potengi.

Vigilância Entomológica o Município de Natal

A vigilância entomológica é um importante instrumento, que com bases técnicas, auxilia à administrar e operacionalizar os indicadores nas ações de prevenção e controle vetorial, tem como principal objetivo identificar fatores que influenciem à ocorrência de doenças veiculadas por vetores de importância médica. Um dos instrumentos utilizados por essa vigilância é à armadilha ovitrampa, neste monitoramento se propôs realizar a coleta de ovos do mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* principais transmissores da dengue.

Em toda à extensão de natal, as armadilhas foram instaladas respeitando a distância de 300 metros entre elas. No total de 500 pontos de instalação, buscando identificar pontualmente a densidade vetorial e sua expansão, a fim de direcionar as ações de controle.

Para análise são calculado os Índices de Positividade de Ovitrampa (IPO), que mostra a distribuição espacial da infestação do vetor no local, e o Índices de Densidade de Ovos (IDO), que mostra a periodicidade maior e menor da reprodução das fêmeas no local.



Modelo de armadilha utilizado em toda Natal




Figura 08: *Distribuição espacial dos índices de densidade de ovos até a 13ª semana epidemiológica.*

Conforme os resultados de IPO até a 13ª semana epidemiológica, sete bairros apresentam alto índice de positividade de ovos. Três estão localizados no distrito sanitário leste, dois no oeste, um no norte II e um no sul **(figura 08)**. Quanto à distribuição dos índices de IPO e IDO por distrito sanitário, observa-se que o distrito oeste apresenta maior índice de positividade de ovos e índice de densidade de ovos **(figura 09)**.




Figura 09: *Distribuição dos índices de IDO e IPO até 13 semana epidemiológica.*

Podemos observar na **figura 10**, a situação entomológica no Município de Natal. Nota-se um declive no índice de positividade de ovitrampa IPO e no índice de densidade de ovitrampa IDO. IDO fica abaixo do limite esperado, todavia IPO permanece acima da média.




Figura 10: *Distribuição dos índices de IPO e IDO por semanas epidemiológica.*

As informações contidas neste boletim epidemiológico, estão sujeitas à alterações.

Centro de Controle de Zoonoses:
Endereço: Avenida das Fronteiras, nº 1526 – Bairro: Potengi
Tel: 3232-8235
Email: zoonoses.natal.rn@gmail.com

Núcleo de Vigilância Entomológica:
Tel: 3232-9789
Email: vigilanciaentomologica.natalrn@gmail.com

Márcia Cristina B. de Melo Moura
Chefe do Núcleo de Vigilância Entomológica

Núcleo de Vigilância Epidemiológica:
Tel: 3232-8238
Email: ccznatal.dengue@gmail.com

Carlos André do Nascimento
Chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica

Ruana Clara Bezerra Gonçalves
Técnica do Núcleo de Vigilância Epidemiológica